



**SMT – 1,5**

- + СУКЦИНАТ**
- + МАННИТОЛ**
- + ТРЕГАЛОЗА**

**протоколы** применения



гель косметический, соответствует ТР ТС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», что подтверждается декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.13756/25

# СУКЦИНАТ + МАННИТОЛ + ТРЕГАЛОЗА

SMT — 1,5

## СОСТАВ

ГК 1,5% 1850 кДа  
сукцинат 1,6%  
маннитол 0,5%  
трегалоза 0,5%

## ОБЪЕМ НАПОЛНЕНИЯ

6,5 мл.

## pH

от 7,0 до 7,6



Допускается применение геля с использованием мезороллера\*

\* механическое приспособление в виде валика, на поверхности которого расположены выступающие иглы малого диаметра



## ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА

**Применяется** в виде натриевой соли, сукцинат натрия.

**Поставщик** — Sigma Aldrich (Германия) / Scharlab (Испания).

**Концентрация** — 1,6%.



## МАННИТОЛ

**Поставщик** — PanReac AppliChem (Испания).

**Концентрация** — 0,5%.



## ТРЕГАЛОЗА

**Поставщик** — Dayang Chem (Китай).

**Концентрация** — 0,5%.



# СУКЦИНАТ + МАННИТОЛ + ТРЕГАЛОЗА

## ПОКАЗАНИЯ

СУХАЯ ДЕГИДРАТИРОВАННАЯ КОЖА

ПОДГОТОВКА К АППАРАТНЫМ МЕТОДИКАМ

ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

ВОЗРАСТНОЕ СНИЖЕНИЕ  
ЭЛАСТИЧНОСТИ И УПРУГОСТИ КОЖИ

СТРЕССОВАЯ КОЖА И ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Курс 4-6 процедур

Поддерживающий 1 раз в 6-12 мес

Возможно сочетание с другими  
препаратами линейки в одну процедуру

Интервал между процедурами 14 дней

# СУКЦИНАТ + МАННИТОЛ + ТРЕГАЛОЗА

SMT — 1,5


## РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

На лицо и субментальную зону .....	2,0 мл
Зона шеи и декольте (в зависимости от площади) .....	2,0-3,0 мл
Кисти рук .....	2,0 мл
Другие участки тела .....	1,0 мл на площадь 15 см

→  
СПОСОБСТВУЕТ

- **осветление** кожи;
- **осветление** зон гипермелантации, удаление застойных пятен;
- **уплотнение** кожи, **восстановление** тонуса кожи;
- **восстановление** гидратации как дермы, так и эпидермиса;
- **повышение** степени переносимости кожей травмирующих процедур;
- опосредованный **лифтинг**;
- **повышение** качества и скорости наступления результата после травмирующих процедур.





## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### СТАНДАРТНЫЙ КУРС


3-4 процедуры раз в 10-14 дней

### ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС

3-4 процедуры раз в 10-14 дней.  
после – 1 процедура в мес.

### СОЧЕТАННЫЙ ПРОТОКОЛ

стартовая процедура для всех типов старения, кроме деформационно-отечного.



### СТАНДАРТНЫЙ КУРС

3-4 процедуры раз в 10-14 дней

### ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС

3-4 процедуры раз в 10-14 дней.  
после – 1 процедура в мес.

### СОЧЕТАННЫЙ ПРОТОКОЛ

стартовая процедура для всех типов старения, кроме мелкоморщинистого.

# ДО/ПОСЛЕ

SMT — 1,5

Пациент — 63 года

В анамнезе:

- лейкоз в ремиссии 4 года;
- рак груди 12 лет;
- склеродермия однократный спонтанный очаг 2008 год (ремиссия);
- ИБС.

Протокол

Сукцинат + маннитол + трегалоза —

3 мл. лицо, шея. 3 процедуры 1 раз в 14 дней

Цинк — 2 мл. однократно

фото из архива врача Ротарь И.Р.



Jufora®

до/после препарата SMT — 1,5

# ДО/ПОСЛЕ

SMT — 1,5

фото из архива врача Ковалюк А.И.

Сукцинат + маннитол + глутатион —  
через 14 дней

**Сукцинат + маннитол + трегалоза** —  
через 21 день

Сукцинат + ПДРН



ДО



после





г. Москва, территория Инновационного центра  
«Сколково», Большой Бульвар 42, с1



[jufora.com](http://jufora.com)



[jufora\\_ru](https://t.me/jufora_ru)



[jufora.ru](https://www.instagram.com/jufora.ru)

8 (800) 201-99-88